




gleba

Una empresa  **anasac**



EL ESCUDO PROTECTOR PARA SUS GRANOS

www.glebaambiental.com.ar



/glebaambiental



@glebaambiental

Deltametrina 2,5% + Butóxido de Piperonilo 25% Formulado Concentrado Emulsionable

PRESENTACIÓN

Botella por 1 litro, Bidón por 4 y 20 litros.



¿QUÉ CONTROLA?

INSECTOS RASTREROS Y/O VOLADORES. Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica*); gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius*), gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*), gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais*), palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella*), carcoma achatada de los granos (*Zaenophloeus minutus*), tribolio castaño (*Tribolium castaneum*), tribolio confuso (*Tribolium confusum*), polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella*), carcoma dentada de los granos (*Oryzaephilus surinamensis*), carcoma grande de los granos (*Tenebroides mauritanicus*), polilla de la harina (*Anagasta kuehniella*).



ASPECTOS RELEVANTES

Producto diseñado específicamente para prevenir la aparición de plagas en productos almacenados. Brinda períodos de protección superiores a los 12 meses. Controla un amplio espectro de insectos incluido el Taladrillo de los granos. Dada la concentración del ingrediente activo y su bajo nivel de toxicidad, los granos tratados pueden utilizarse inmediatamente. No transmite olor a los granos y no afecta el poder germinativo de las semillas. Es ideal para el tratamiento de estructuras edilicias, silos, celdas, etc.



DOSIS DE USO

Grano embolsados: 50 - 80 ml cada 5 litros de agua (para 100m²).
Instalaciones y transportes: 50 - 80 ml litros de agua (para 100 m²).
Termonebulización: 200 ml cada 10 litros de gas-oil (para 10.000 m³).



¿DÓNDE SE APLICA?

Puede aplicarse dentro de estructuras edilicias (depósitos, silos, molinos, bodegas, camiones, acoplados, vagones, buques, buques, etc.) y en exterior.



BUEN USO

Diluir la cantidad necesaria de **ONZAMAX[®]** en 500 a 800 cm³ de agua por tonelada de grano. El grano a tratar debe estar sano, seco y limpio. Tratar los granos a medida que entran al silo o al efectuar un pasaje entre silos. La pulverización debe ser fina y uniforme, de esta manera se logra un adecuado contacto entre el producto y los granos.



MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, DIRIGIRSE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LLEVANDO EL ENVASE O RÓTULO DEL PRODUCTO.