

INSECTICIDA

VELOXAN

CONCENTRADO
EMULSIONABLE

DERRIBANTE



- Exclusiva fórmula más amigable al medio ambiente con vehículo de origen natural.
- Toxicidad moderada con equilibrado balance de activos.
- Amplio espectro de control.
- Residualidad, poder de desalojo y repelencia.
- Menor toxicidad no produce irritación en condiciones normales de uso.
- Menos olor que se diluye a los pocos minutos de su aplicación.

Veloxan DERRIBANTE dentro de sus componentes tiene solventes de origen natural que lo hacen amigable al medio ambiente, con una equilibrada combinación de activos. La cipermetrina proporciona un efecto insecticida de mortalidad y residualidad, mientras que la tetrametrina incrementa la acción de volteo sobre la plaga. La presencia de butóxido de piperonilo inhibe las enzimas de detoxificación, realizando la acción insecticida.

Veloxan DERRIBANTE es apto para ser usado tanto en hospitales, escuelas, restaurantes, casas, instalaciones deportivas, depósitos, fábricas, industrias alimenticias, mataderos, frigoríficos, granjas, cabañas, establos, tambos, como en countries, jardines, parques y paseos.



PLAGAS
CONTROL DE PLAGAS

Actúa sobre insectos voladores como *mosquitos, moscas, avispas, polillas, tábanos, jejenes* y otros.

Insectos rastreros: *cucarachas, arañas, hormigas, chinches, alacranes, garrapatas, pulgas, piojos y bicho bolita.*

INSECTICIDA

VELOXANCONCENTRADO
EMULSIONABLE**DERRIBANTE****COMPOSICION**

Cipermetrina.....	2 g
Tetrametrina.....	2 g
Butóxido de piperonilo.....	5 g
Solvente y emulsionantes c.s.p.....	100 ml

MODO DE ACCION

La **Cipermetrina** actúa por contacto e ingestión, de la familia de los Piretroides, produce una rápida acción observada a través de incoordinación e inestabilidad motora. Finalmente produce el volteo y muerte del insecto.

El **Butóxido de piperonilo** es un sinergista de los insecticidas que potencia la acción de los mismos. Impide la detoxificación enzimática del insecticida por parte del insecto. Esto permite que las concentraciones del insecticida dentro del organismo del insecto no se pierdan ya que impide su metabolización, permaneciendo más tiempo y en mayor proporción dentro del sistema nervioso del insecto.

La **Tetrametrina** a diferencia de otros Piretroides carece de grupo "Ciano" y se caracteriza por inducir picos múltiples de descargas en los nervios sensoriales, en los nervios motores y en las interneuronas dentro del sistema nervioso central. La duración de las corrientes de sodio modificadas dura décimas o centésimas de milisegundos. Este mecanismo permite provocar en el insecto un rápido volteo e inactivación súbita del funcionamiento del sistema nervioso.

FORMULA MOLECULAR Cipermetrina**FORMULA MOLECULAR Butóxido de piperonilo****FORMULA MOLECULAR Tetrametrina****TOXICIDAD**

Clase IV OMS

PRESENTACION

Botella por 1 lt.

Bidones por 5 y 20 lts.

MODO DE APLICACION

Pueden utilizarse equipos motorizados o manuales. Pulverizar los sitios frecuentados por las plagas, en donde se posan, transitan, refugian, reproducen y en los sitios por donde puedan acceder a los edificios, locales o instalaciones.

Rociar paredes, techos, pisos, con un pulverizado fino del producto diluido en agua hasta cubrir las superficies. Utilizar la dosis mayor en los casos de superficies porosas o absorbentes y en infestaciones altas.

Esta recomendado para tratamiento en interiores, tratamientos residuales de superficies, tratamientos espaciales: termofogging o niebla fría y en tratamiento aéreos para el control de insectos voladores (moscas y mosquitos).

REGISTROS

RNPUD N° 0250042

RNE N° 020034835

Elaborado y Distribuido por:




Punch Química S.A.**División Sanidad Ambiental**

M.T. de Alvear 4734 (1702) Ciudadela

Pcia. Buenos Aires - Argentina

www.glacoxan.com**TIEMPO DE VOLTEO EN Culex quinquefasciatus**

Fuente: Ensayos de laboratorio Veloxan DERRIBANTE

**FORMULA ESTRUCTURAL Cipermetrina****FORMULA ESTRUCTURAL Butóxido de piperonilo****FORMULA ESTRUCTURAL Tetrametrina**

● cloro
● oxígeno
● hidrógeno
● carbono
● nitrógeno

DOSIS DE APLICACION**Tratamientos residuales de superficies**

Insectos rastreros
Insectos voladores

45 a 60 cc para rociar 20 m²
30 a 50 cc para rociar 20 m²

