

Tipo de documento:	FICHA TÉCNICA	FT 013-V01
Producto:	Lanox	
Denominación:	Insecticida. Mata Polillas (adultas y larvas)	
Formulación:	Aerosol	
Emitido por:	Adriana Tomalino	
Fecha de emisión:	22/10/2018	

Composición:

Cifenoctrina* 0,4 %p/p + Imidacloprid** 0,035 %p/p + Butóxido de piperonilo*** 1,0 %p/p

*CAS: 39515-40-7 / **CAS: 138261-41-3 / *** CAS: 51-03-6

Eficacia del producto:

LANOX® es un insecticida en aerosol, eficaz para el control de polillas (*Tineola spp*) y sus larvas. También controla otros insectos voladores tales como moscas, mosquitos, avispas, tábanos.

Modo y dosis de aplicación:

Agítese bien antes de usar. Utilice ropa de protección adecuada (guantes, protección ocular y respiratoria). Antes de aplicar el producto, identifique los sitios donde haya evidencia de actividad de polillas como por ejemplo restos de aserrín cerca de los muebles o en el interior de cavidades de madera, pequeños orificios en patas o cuerpo de objetos de madera, ropa o libros dañados. También pueden escucharse ruidos nocturnos característicos en techos y entrepisos. LANOX® es adecuado como tratamiento puntual en grietas, hendiduras, rajaduras, detrás de los zócalos, bibliotecas, tablas de piso de parquet, debajo de los muebles, en las esquinas, rincones, marcos de puertas y ventanas, revestimientos de madera, cajones, placards, armarios y demás lugares donde se suelen esconder las polillas. Vacíe armarios, roperos y alacenas antes de la aplicación. Los estantes de las alacenas deberán ser limpiadas con un trapo húmedo antes de colocar nuevamente utensilios y alimentos.

Antes de aplicar identifique el sitio elegido para la aplicación del aerosol y dirija la válvula hacia él. Accione la válvula sosteniendo el envase a 20 – 30 cm. Luego de la aplicación se recomienda mantener el ambiente cerrado durante una hora para asegurar un buen control. Antes del reingreso ventile adecuadamente abriendo puertas y ventanas, durante media hora.

Se recomienda no aplicar el producto sobre superficies plásticas, de acrílico o laqueadas.

Volver a aplicar en caso de que haya signos de reinfestación.

Para proteger prendas de las larvas y huevos de polillas, cepíllelas y rocíelas con LANOX® en forma pareja a una distancia de 30 cm. Ventile la prenda tratada al menos un día antes de usarla. Evite el uso excesivo.

Precauciones generales: CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No fumar o comer durante su aplicación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase del producto. En caso de ingestión no provocar el vómito.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. Mantener el producto en su envase original. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar

Tipo de documento:	FICHA TÉCNICA	FT 013-V01
Producto:	Lanox	
Denominación:	Insecticida. Mata Polillas (adultas y larvas)	
Formulación:	Aerosol	
Emitido por:	Adriana Tomalino	
Fecha de emisión:	22/10/2018	

inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado. ¡Inflamable! No perforar el envase aunque esté vacío. No volver a utilizar los envases vacíos. Prohibido su relleno. Usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria. No arrojar al fuego o al incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Lavarse las manos con agua y jabón luego de su aplicación. No contaminar los cursos de agua. Disponer los envases vacíos en forma segura. No exponer a temperatura mayor a 50 °C.

Lea atentamente las instrucciones de uso, las precauciones generales y advertencias del rótulo antes de utilizar el producto.

Indicaciones para uso médico:

Indicaciones para uso médico:

Grupo químico: piretroide. Nombre común: Cifenoctrina. Antídoto: no tiene. Aplicar antihistamínicos y tratamiento sintomático.

Grupo químico: neonicotinoide. Nombre común: Imidacloprid. Antídoto: no tiene. Aplicar tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: 011 4658-7777 y 4654-6648; número gratuito: 0800-333-0160. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5555. En Uruguay: CIAT, Tel.: (02) 1722.

Registrado en:	Uruguay M.S.P. 83729 I.M.M. S.S.P. N° 511	Bolivia -----	Ecuador -----	Perú -----	Paraguay -----	Rep. Dominicana -----	Venezuela -----	Panamá -----
	Argentina RNPUD: 0250024	Honduras -----						

Fabricado por: BINKA S.A. Esmeralda 847, piso 16, C1007ABI, Buenos Aires, Argentina.
RNE: 010040266. Tel/Fax: 4368-6700. consultatecnica@binka.com.ar.