

# Cebo Hormiguicida Profesional

## DESCRIPCION:

Formix gel es un cebo insecticida para el control de la hormiga Carpintera o Arará (camponotus sp) y hormigas invasoras de viviendas y estructuras edilicias tales como la Hormiga Argentina (iridomyrmes humilis) la Hormiga Roja (solenopsis sp), etc. No es efectivo para especies podadoras.

# Formix gel

Profesional

## MODO DE APLICACION:

- 1-Inspeccione la zona a tratar identificando las áreas donde se aplicarán los cordones de cebado.
- 2-Retire la tapa de la punta y aplique franjas o cordones de cebado de 3 a 5 cms de largo cada 3 mts. y al costado de la senda de las hormigas, presionando suavemente el émbolo de la jeringa.
- 3-Revisar periódicamente los puestos de cebado.
- 4-Terminada la aplicación volver a colocar la tapa de la punta de la jeringa.
- 5-Utilizar guantes durante el cebado.

## IMPORTANTE:

- \*No colocar el cebo en áreas de lavado frecuente.**
- \*No aplicar ningún insecticida luego de la colocación del cebo.**
- \*En caso de que se haya aplicado algún insecticida, esperar 7 a 10 días antes de realizar el cebado.**

## LUGARES DE APLICACION:

Colocar el cebo en cordones de 3 a 5 cms. Cada 2 a 3 mts. al costado de las sendas y próximo a los nidos.

**En interiores:** en grietas, fisuras, rincones y lugares fuera del paso, tal como debajo y detrás de artefactos de cocina, a lo largo de zócalos, bajo piletas, alacenas, cielorrazos, alrededor de cañerías y calentadores de agua (calefones, termo tanques) marcos de puertas y ventanas.

En el garage, altillo y conductos de refrigeración o calefacción.

**En exteriores:** colocar el cordón adyacente al sendero donde se vean las hormigas y en áreas sospechosas de actividad. Posibles entrada a la casa: aleros, cañerías, cableado. Arboles, tocones, raíces, cercos, canteros, pilas de troncos, etc.

Calor o frío extremo, luz solar y agua directas, pueden reducir el efecto residual.

Inspeccionar periódicamente los puestos de cebado y reponer donde se haya deteriorado.

Dependiendo del tamaño de la colonia y del grado de aceptación del cebo, el control de la Hormiga Carpintera se observará, en promedio, dentro de los 3 a 5 días. En las especies pequeñas (Hormiga Argentina, Faraón, Pavimento, Roja común, etc.) el período puede ser más amplio variando entre 3 a 30 días.

Durante el tratamiento se observará una disminución progresiva de hormigas. No necesariamente se verán hormigas muertas.

El poder de atracción del cebo se mantiene durante 3 semanas (dependiendo de la forma y lugar de su aplicación).



Comercial



Industrial



Residencial



## DOSIS DE APLICACION



Cordón de 3 a 5 cms. cada 3 mts.