

mosca**PLUS**

IMIDACLOPRID 0,5%

Z-9-TRICOSENE 0,25%

PARA TERMINAR CON UN ENEMIGO QUE SE MULTIPLICA

 Provocan stress en los animales.

 Principales transmisoras de salmonelosis.

 Son portadoras de graves enfermedades.

 Las moscas contaminan el alimento.

Composición

Cada 100 g contiene:

Imidacloprid	0.50 g
Z-9- tricozene	0.25 g
Excipientes c.s.p.	100 g

Indicaciones

Para el control de la mosca adulta doméstica en gallineros, depósitos y galpones.

Especies de destino

Para el control de la mosca adulta doméstica en gallineros, depósitos, galpones y todos aquellos lugares donde se producen concentraciones de moscas.

Administración y dosis

Cebo húmedo: mezclar 15g de producto con 15 ml de agua y colocar en platos y bandejas. Volver a humedecer cada vez que se seque hasta que el producto pierda actividad.

Aplicación por pintado: Mezclar 100 g de producto con 100 ml de agua y aplicar mediante pincel o brocha en las superficies donde se posan

las moscas. Revolver la mezcla en forma permanente mientras se aplica. Preparar la mezcla en el momento.

Aplicación por aspersión: Mezclar una parte de cebo en una parte de agua (1 kg en 1 litro) agitar durante 15 minutos. Aplicar con aspersor de gota gruesa.

Advertencias: Una vez aplicado reactivar el producto mediante pulverizaciones con agua. Mantener el envase bien cerrado entre usos.

Precauciones

PRODUCTO TOXICO (Clase III). Conservar en su envase original. Peligrosa su ingestión o aspersión. Evitar el contacto con ojos o piel. Lavarse bien las manos luego de manipular el producto.

No contaminar cursos de agua. Producto toxico para invertebrados acuáticos y abejas.

Destruir o eliminar los envases vacíos.

Almacenamiento

Mantener al abrigo de la luz entre 5 y 25 °C

Presentación

1 kg y 5 kg.



Aviar
LABORATORIOS

Santos Dumont 4345 - (1427) Buenos Aires
Tel.: 4855-6374 / 4854-5523 - Fax: 4854-0282
E-mail: aviar1@laboratoriosaviar.com.ar